

# AminoQuelant-B plus

## Коректор на недостига на бор с Аминокиселини

### ГАРАНТИРАН АНАЛИЗ

Бор..... 8 % (w/w)

Свободни аминокиселини..... 5% (w/w)

Азот..... 3% (w/w)

### ПРИЛОЖЕНИЕ

AminoQuelant<sup>®</sup>- B plus е коректор на недостига на бор със свободни аминокиселини, който се прилага като листен спрей върху растения, нуждаещи се от хранителна добавка на Бор.

Борът в AminoQuelant<sup>®</sup>- B plus бързо се абсорбира и пренася до израстващите части на растението, където обикновено има по-голям недостиг на бор. Борът е ключов елемент за образуване на пектати в растителните клетки и при опрашването и плодообразуването.

Присъстващите във формулата свободни Аминокиселини се използват от растението за увеличаване на фотосинтезната активност и други метаболитни процеси като по този начин намаляват стресовите фактори и правят бора по-бързо усвоим от растението.

AminoQuelant<sup>®</sup>- B plus може да се използва за предотвратяване и коригиране недостига на Бор при много култури. Най-честите симптоми за недостиг на Бор са:

- Обезцветяване или некроза при младите листа и израстващите части
- Опадване на листата на филизите при остър недостиг
- Недостатъчен цъфтеж и плодообразуване, последвани от опадване на плодовете и/или малформации на плодовете.

### КУЛТУРИ И ДОЗИРОВКА

Някои култури проявяват специфични симптоми, когато страдат от недостиг на Бор.

- Захарно цвекло : Загниване на сърцевината, изсъхване на връхчетата на младите листа

- Ябълки и Круши : малформации при плодовете, свиване, сухи плодове
- Люцерна : обезцветяване и спиране на растежа
- Грозде : Недостатъчно плодообразуване, малки зърна, обезцветяване на листата
- Маслини : Обезцветяване на листата, опадване листата на филизите, свиване на плодовете, опадване на плодовете
- Цитрусови : Обезцветяване на листата, точици от смола вътре в плодовете, дебела кора
- Зеленчуци : Кухи стебла, обезцветяване на листата, изсъхване на връхчетата на младите листа, спиране на растежа, напукване на плодовете и свиване.
- Ягоди : Малформации на плодовете
- Броколи, Цветно зеле : Кухо стебло
- Кервиз : Напукано стебло
- Картофи : Почерняване на грудките, спиране на растежа, завити листа.

Дозировка :

Дозировката може да варира в зависимост от степента на недостиг на Бор и броя на третирания, които ще се извършат. Най-общо се препоръчва следното:

Зеленчуци и плодни дръвчета : 1 – 3 ml/L вода.

Полски култури (Захарно цвекло, Люцерна, Картофи и др.): 1-3 L/Ha

При плодовете да се прилага преди цъфтежа и да се повтаря при плодообразуването и развитието на плодовете

При зеленчуци и полски култури да се прилага 1-3 пъти по време на растежния цикъл на растенията като се започне при млади растения.

### **СЪВМЕСТИМОСТ**

AminoQuelant<sup>®</sup> - В plus нормално е съвместим с най-често използваните пестициди и торове. Ако има неизвестна съвместимост, по-добре е да се извърши предварителен тест преди третирането.

**СЪДЪРЖАНИЕ : 1 L**

**Произведено в Испания от BIOBIERICA, S.A.**